

オブジーボ療法を受けられる方へ

発行日:

様

		入院日/1日目	2日目(退院日)
日付		/	1/1
目標		<input type="checkbox"/> 化学療法のスケジュールが理解できる <input type="checkbox"/> 副作用が理解できる	<input type="checkbox"/> 抗がん剤投与が問題なく終了する <input type="checkbox"/> 退院後の生活の注意点が理解できる
治療	抗がん剤		1種類の抗がん剤を点滴します オブジーボ <点滴時間:約1時間>
	薬	現在飲んでいるお薬を確認します	オブジーボ後、生理食塩水(約10分)を点滴します 点滴終了後、看護師が針を抜きます
副作用		アレルギー反応 (のどの違和感・不快感) 血管外漏出 (点滴漏れ・刺入部痛)	発熱、悪寒、ふるえ、かゆみ、発疹、息苦しさ 食欲不振、吐き気、嘔吐、倦怠感
検査		血液検査、尿検査、レントゲンなどを行います 初回は心電図検査を行います	
検温		入院時に検温します	点滴終了1時間後と夕食後に検温します 退院前に検温します
測定		入院時に身長と体重を測定します	
日常生活	活動	制限はありません 呼吸困難感、息切れ、倦怠感などがある場合は必ず看護師へお知らせください	点滴中は長時間の歩行は避けましょう 制限はありません
	食事	制限はありません。無理のない程度に食べてください 食べられない時でも水分はなるべく摂るようにしてください 食べられない時は看護師にお知らせください。食事を止めることもできます	
	清潔	入浴できます	点滴後は体調に合わせてシャワー浴または入浴できます
説明		入院生活について看護師が説明します 化学療法の同意書をお預かりします(1回目のみ) 持ち物は必要最小限とし、貴重品類は自己管理してください	退院後の生活、次回外来日について説明があります 看護師より患者日誌記載の説明があります 診察券、お薬などをお渡します

退院後の生活について

退院後は以下のことに注意してお過ごしください。

①次の症状がある場合は下記へ連絡してください

- ・38度以上を超える発熱
- ・空咳、息切れ、呼吸困難感があるとき
- ・頻回の下痢、目のかすみが数日間続くとき

②手洗い、うがいを行いましょう。
人混みはなるべく避けましょう。

③吐き気・食欲不振が持続する場合は、無理せず口に合うものを摂取してください。脱水予防のため水分摂取を心がけましょう

④退院後も日誌の記載を続けてください
次回受診日に日誌を持参してください。

055-989-5222(代表)

※平日の日中(8:30~17:00)は皮膚科外来につながります

※夜間・土日祝日は救急外来につながります