



植松孝悦(うえまつ・たかよし)氏
県立静岡がんセンター 生理検査科医長
1992年新潟大医学部卒。同大放射線医学教室入局。新潟県立がんセンターを経て2002年から静岡がんセンター画像診断科医長。08年から生理検査科医長。専門は乳がんの画像診断とIVR。日本乳癌学会認定医・専門医。日本放射線腫瘍学会専門医。検診マンモグラフィ読影認定医など。

20人に1人がかかるがん

乳腺、乳房の構造を説明します。乳頭から母乳の通り道「乳管」が木の根のように広がっています。乳管の先にブドウの房のような形の「小葉」があり、ここで母乳が作られます。このように小葉と乳管で乳腺が作られその周りに脂肪、靭帯などがついて乳房を構成しています。

乳がんは小葉や乳管の上皮細胞が無制御に増殖してがん化します。

乳がんは病態によって2つに大きく分かれます。がんが小葉、乳管の中にとどまり「基底膜」を破っていない状態のがんを非浸潤がんと呼びます。この場合転移する能力はなく、切除すれば治ります。

しかし、がんが成長し、この膜を破って周囲に広がる、がん細胞が血管やリンパ

上手ながん治療の受け方

静岡県立静岡がんセンター公開講座第6弾「上手ながん治療の受け方」(静岡新聞社・静岡放送、三島市民文化会館主催、県立静岡がんセンター共催、スルガ銀行特別協賛)の第6回講座が2月20日、三島市民文化会館で開かれ、植松孝悦生理検査科医長と、田沼明リハビリテーション科部長が乳がんを早期発見・早期診断するための正しい知識、がんとリハビリ～術前と術後～をテーマに講演しました。その概要をお伝えします。

<企画・制作/静岡新聞社営業局>

重要性増す 周術期リハビリ

5年後にわが国のがんの罹患者数は年間約90万人、生存者533万人と推定されています。高齢化が進むなかで患者数は増加し、さらに、生存率が向上しているため、がん生存者、つまりがんにかかったけれどもしっかり生きていく、という方が非常に増えているわけです。

そこでリハビリの必要性がより高まってくるわけです。静岡がんセンターはがん専門病院として初めてリハビリ科を設置した病院です。あらゆる状況の患者さんにリハビリを提供していますが、特に手術前後のリハビリに力を注いでいます。

手術前後、周術期と呼びますが、この時期の特徴としては手術後どのような合併症が起こりやすいか、あるいは麻酔の影響、あるいは開胸、開腹の影響で、呼吸機能が一時的にかなり落ちることが知られています。

手術後は痰が増えやすいのですが、それをうまく出せず肺の中で詰まってしまう空気が入りにくくなる場合があります。肺の重要な機能として、酸素を取り込んで二酸化炭素を出す働きがあります。空気が入らないとその働きができません。呼吸するの非常に不利といつことになります。

次に乳がんの周術期のリハビリです。乳がんの手術後の

管に入り込み、肺や肝臓、骨や脳など全身に転移する能力を持ってしまいます。この状態を「浸潤がん」とよび、術後に抗がん剤やホルモン剤などが必要になります。

日本人女性の乳がん罹患率のピークは40歳代、死亡率のピークは50歳代で、女性の20人に1人がかかる病気です。

あげられます。脂肪から女性ホルモンに似た物質が出るため、太って脂肪が多い方は乳がんになりやすいのです。

乳がんを早期発見・早期診断するための正しい知識

県立静岡がんセンター 生理検査科医長 植松孝悦氏

を避けることも避けられませんが、過去の検査で異型細胞などの前がん病変の診断歴がある方は、乳がんになる危険性が高くなります。

女性ホルモンの刺激が乳がんのがん化を促し増殖させますので、女性ホルモンに暴露する時間が長いと、残念ながら乳がんになる危険性は高くなります。

アメリカの女性は7〜8人に1人の割合で乳がんになります。以前は、乳がんは日本人には少ないとされてきましたが、近年食生活、ライフスタイルが欧米化したことが要因で、1995年を境に、乳がんが日本人女性のがんのトップになっていきます。

日本で増える乳がん

マンモグラフィーは板で乳房をギュッと挟んで撮影しますが、この圧迫は検査にとっても重要です。撮影にはエックス線を使用しますが、圧迫した

では手術後、呼吸の合併症を予防するにはどうしたらいいか。まずは禁煙です。手術の2カ月以上前から禁煙すると、術後の呼吸の合併症がかなり減るといってデータがあります。

マンモグラフィーと自己触診を

がんの種類に合わせたリハビリ

この予防的リハビリのうち、まず呼吸リハビリのケースを食道がんの例でお話しします。食道がんの手術でなぜ呼吸リハビリが必要か。全身

リハビリの目的はリンパ浮腫(リンパ液がたまるむくみ)の予防と、肩関節が固まってしまうことの予防です。

多岐にわたる手術の影響と対策

がんとリハビリ

県立静岡がんセンター リハビリテーション科部長 田沼明氏

麻酔の影響、あるいは開胸、開腹の影響で、呼吸機能が一時的にかなり落ちることが知られています。

因はいろいろあり、リハビリの進め方も異なります。

頸(けい)部リンパ節をとってしまつと、原発巣がどこであるうと僧帽筋という肩の筋肉にしばしば麻痺が起こり、腕を上げる動きなどに障害が出ます。

さらに、乳房を均一に圧迫することで、より鮮明な画像を撮影することができます。

最後に、乳輪の近くを軽くつまんで、乳頭から血の混じったような分泌物が出ないかどうかを調べ、前述のような異変を感じたら専門医を受診してください。

最後に、乳輪の近くを軽くつまんで、乳頭から血の混じったような分泌物が出ないかどうかを調べ、前述のような異変を感じたら専門医を受診してください。



田沼明(たぬま・あきら)氏
県立静岡がんセンター リハビリテーション科部長
1996年慶応大医学部卒。同年同大リハビリテーション医学教室入局。2005年静岡がんセンターリハビリテーション科医長。07年より同科部長。日本リハビリテーション医学会専門医・指導責任者。日本臨床生理学会認定医。厚生相委託事業がんのリハビリテーション研修委員会委員。

手術後は痰が増えやすいのですが、それをうまく出せず肺の中で詰まってしまう空気が入りにくくなる場合があります。肺の重要な機能として、酸素を取り込んで二酸化炭素を出す働きがあります。空気が入らないとその働きができません。呼吸するの非常に不利といつことになります。

次に乳がんの周術期のリハビリです。乳がんの手術後の

頭頸(けい)部が、口や喉回りのがんの場合、手術の部位によってリハビリの内容は異なりますが、例えば舌のがんで、舌をたくさん取ってしまうとしゃべることができない、飲み込むことができない、あるいは喉頭を全摘すると声が出なくなってしまうと、声帯をとる手術の場合には、片手で持てるほどの小さな器具、震えを発生させて皮膚の上から震えを喉の空気に伝えるという電気式人工喉頭を用いて、発声練習する方法や食道発声の練習を取り入れて

足(あし)の骨の手術の場合は多く呼吸リハビリと同様、事前に練習を重ねておく、術後に

生理終了後、約1週間前後が目安です。閉経後の人は毎月日を決めて行いましょう。

生理終了後、約1週間前後が目安です。閉経後の人は毎月日を決めて行いましょう。

タウンミーティング ◆質疑応答◆

質問 痛くないマンモグラフィー検査はありますか。
植松 乳房の圧迫は被ばく量を減らし、鮮明な画像を得るために必要です。圧迫が弱くてむし層撮影型という最新機種が普及すれば痛みは減少されると思われます。生理が終わった直後だと痛みを強く感じます。検査日を生理後2週以降に予定しましょう。がんの早期発見、早期治療には、自分の乳房の様子を定期的に把握することが不可欠です。定期検査を欠かさないでください。

質問 がん治療にともなうリハビリはどの病院でも同じレベルで受けられますか。
田沼 がん治療の内容によりばらつきがあるのが現状です。呼吸リハビリは広くおこなわれていますが、嚥(えん)下のリンパや、頸(けい)部リンパ節切除にともなうリハビリを専門的におこなえる医療機関は多くないと思います。当センターでは、紹介状があれば、他の病院で受けたがん治療のリハビリ指導も可能です。

山口 必要なりハビリの内容や開始時期などを検討する必要があるため、まずは、当センターのよろず相談に電話してください。