

静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程入学試験

【皮膚・排泄ケア分野】筆記試験 過去問題

問題1 次の問題の文章を読み、適切な答えを1つ選びなさい。

【問1】尿路の解剖と機能で正しいのはどれか。

- ① 上部尿路とは、腎盂と膀胱のことである。
- ② 尿管は、約 50 cm～70 cmである。
- ③ 尿管は蠕動運動することで、尿を副腎から膀胱まで運ぶ。
- ④ 尿道の長さは、男性は約 20 cm、女性は約 4 cmである。

【問2】排便のメカニズムについて、a と b の説明で当てはまるのはどれか。

- a 内肛門括約筋は、交感神経の作用によって弛緩する。
- b 直腸が伸展することによって、反射で便意を自覚する。

- ① どちらも正しい
- ② どちらも誤り
- ③ a のみ正しい
- ④ b のみ正しい

【問3】スキン-テアについて、正しい組み合わせはどれか。

- a スキン-テアとは、「摩擦とずれ」に皮膚が裂けて生じる真皮深層までの創傷である。
- b 皮弁が完全に欠損しているスキン-テアは、STAR スキンテア分類のカテゴリー3 である。
- c 皮弁があるスキン-テアを発見した場合は、そのまま乾いたガーゼで圧迫して保護する。
- d カテゴリー1a のスキン-テアに創傷被覆材を使用した場合は、どの面から剥がしても良い。

- ① a、b ② a、d ③ b、c ④ c、d

【問4】創傷の治癒過程において、白血球の遊走を引き起こす炎症性サイトカインや増殖因子が放出される時期はどれか。

- ① 成熟期（再構築期）
- ② 炎症期
- ③ 出血・凝固期
- ④ 増殖期

【問5】 DESIGN-R[®]2020 について、正しい組み合わせはどれか。

- a 7 項目についてそれぞれ評価し、すべての点数を合計する。
- b 創底が壊死組織で覆われていて深さの判定が不能だったので DDTI と判定する。
- c 「滲出液」はガーゼ貼付した場合を想定して判定する。
- d 創面にぬめりがあり、滲出液が多い場合は臨界的定着疑い (I3C) と評価する。

- ① a、b ② a、d ③ b、c ④ c、d

【問6】 褥瘡治療に用いる外用薬について、正しいのはどれか。

- ① 滲出液を減らすために、スルファジアジン銀（ゲーベン[®]クリーム）を使用した。
- ② 硬い壊死組織を融解させるために、褥瘡に精製白糖・ポピドンヨード（ユーパスタ[®]ー軟膏）を使用した。
- ③ 壊死組織を除去するために、ブクラデシンナトリウム（アクトシン[®]軟膏）を使用した。
- ④ 肉芽形成を促進させるために、トラフェルミン（フィブラスト[®]スプレー）を使用した。

【問7】 身体障害者福祉法における身体障害者手帳制度について、誤っているのはどれか。

- ① 永久ストーマ造設患者は、術直後から身体障害者手帳の申請ができる。
- ② 尿路ストーマと消化管ストーマを保有している場合は、3 級が取得できる。
- ③ 身体障害者手帳には、本人確認のための写真が貼付されている。
- ④ 身体障害者手帳を取得すれば、ただちに日常生活用具(ストーマ装具)が給付される。

【問8】 ストーマ合併症と出現しやすいストーマの種類の組み合わせで、誤っているのはどれか。

- ① ストーマ脱出 …………… 消化管ストーマ
- ② ストーマ瘻孔 …………… 尿路ストーマ
- ③ 傍ストーマヘルニア …………… 消化管ストーマ
- ④ 偽上皮腫性肥厚 …………… 尿路ストーマ

【問9】漏出性便失禁になりやすい特徴で、誤っているはどれか。

- ① 高齢者
- ② 直腸切除後
- ③ 直腸脱
- ④ 兔糞便

【問10】腹圧性尿失禁についての説明で、誤っているのはどれか。

- ① 尿道括約筋障害によって引き起こされる。
- ② 男性に比べて女性の発生頻度が高い。
- ③ 尿意切迫感と同時または尿意切迫感の直後に、不随意に尿が漏れる。
- ④ 骨盤底筋訓練が有用である