

レジメン名： Dose-dense EC療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月27日 改訂

対象疾患： 乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	13:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	エピルビン塩酸塩注射用	90mg/m ²	持続点滴末梢(側管)	15分で	13:15		
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	13:30		
No.4	注射用エンドキサン	600mg/m ²	持続点滴末梢(側管)	30分で	13:35		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:05		
No.6	ジーラスタ皮下注3.6mg/0.36mL	1筒	皮下注射	ワンショット 抗がん剤終了後 24時間以降			1回

インターバル日数： 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エピルビン塩酸塩注射用	90mg/m ²	90mg/m ²
No.4	注射用エンドキサン	600mg/m ²	600mg/m ²

備考
アプレピタント内服