静岡県立静岡がんセンター 2024年12月3日 改訂

婦人科 対象疾患:卵巣がん

通しNo	商品名▪規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day (8)	day(15)
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	15分で	11:30		
	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL					
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	11:45		
No.3	パクリタキセル注	80mg∕ m i̇́	持続点滴末梢	60分で	12:00		
	生理食塩液	250mL					
				1)			
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	60分で	13:00		
	生理食塩液	250mL					
N 5		4 1	14 64 5 54 4 100	15/1-5		11.00	11.00
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	15分で		11:30	11:30
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
-	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL	_				
No.6	<u> </u>	100mL		15分で		11:45	11:45
140.0	工程及温水	TOOTILE	170亿元的个们	1073 C		11.40	11.40
No.7	パクリタキセル注	80mg/m²	持続点滴末梢	60分で		12:00	12:00
	生理食塩液	250mL					
	J. am A. J. A.						
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:00	13:00	13:00
				1			

インターバル日数:21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	80mg/ m i	80mg/ m i̇̃
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg/body
No.7	パクリタキセル注	80mg/ m i	80mg∕ m i̇́

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出