レジメン名：TC療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月3日 改訂

婦人科　　対象疾患：卵巣がん、子宮頸がん、子宮体がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	15分で	9:30		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	9:45		
No.3	パクリタキセル注	180mg/㎡	持続点滴末梢	3時間	10:00		
	生理食塩液	500mL					
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	1時間	13:00		
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:00		

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	180mg/㎡	180mg/㎡
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg/body

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出 ※子宮頸がんの場合 　カルボプラチン　AUC5