レジメン名：CBDCA+GEM療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

婦人科　　対象疾患：卵巣がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:00		
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	ジェムザール注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	30分で	10:15		
	生理食塩液（一次溶解液）						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC4	持続点滴末梢	90分で	10:45		
	生理食塩液	250mL					
No.4	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL	持続点滴末梢	15分で		10:00	
No.5	ジェムザール注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	30分で		10:15	
	生理食塩液（一次溶解液）						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:15	10:45	

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ジェムザール注	1000mg/㎡	1000mg/㎡
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC4	600mg/body
No.5	ジェムザール注	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出