

# レジメン名 : PLD+CBDCA+Bv療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

婦人科

対象疾患: 卵巣がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(15)	day( )
No.1	アバスタチン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg	持続点滴末梢	90分で	10:00	10:00	
		100mL		2回目60分で			
				3回目以降30分で			
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:30	11:30	
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	11:35		
		50mL					
No.4	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:50		
No.5	ドキシル注 5%ブドウ糖液	30mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	60分で	11:55		
		250mL					
No.6	カルボプラチン点滴静注液 5%ブドウ糖液	AUC5	持続点滴末梢	60分で	12:55		
		250mL					
No.7	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	13:55		

インターバル日数: 28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	アバスタチン点滴静注用	10mg/kg	10mg/kg
No.5	ドキシル注	30mg/m <sup>2</sup>	30mg/m <sup>2</sup>
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出