

# レジメン名 : XELOX + BV療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年4月16日 改訂

消化器内科

対象疾患: 結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	アバスタチン点滴静注 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
No.2	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg/mL	50mL 2mL	持続点滴末梢	15分で	10:30		
No.3	エルプラット点滴静注液 5%ブドウ糖液	130mg/m <sup>2</sup> 500mL	持続点滴末梢	2時間で	10:45		
No.4	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	化学療法終了時		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	アバスタチン点滴静注	7.5mg/kg	7.5mg/kg
No.3	エルプラット点滴静注液	130mg/m <sup>2</sup>	130mg/m <sup>2</sup>

備考
ゼローダ 2000mg/m <sup>2</sup> /日、分2(朝、夕食後) 2週間内服 1週間休薬 アプレピタント内服