

# レジメン名 : mFOLFOX (m6) 療法 (アレルギー用)

静岡県立静岡がんセンター

2021年2月9日 改訂

消化器内科

対象疾患 : 結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	11:15		
	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL					
	ガスター注射液 20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	13:30		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし 東レ トレフューサーポンプ(3.7mL/h)使用	46時間で	13:35		
	生理食塩液	全量140mL					
No.6	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	85mg/m <sup>2</sup>
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	300mg/m <sup>2</sup>
No.4	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	400mg/m <sup>2</sup>
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	2400mg/m <sup>2</sup>

備考