

レジメン名 : Cmab+FOLFOX (m6) 療法(初回 / 中心)

静岡県立静岡がんセンター

2021年2月9日 改訂

消化器内科

対象疾患: 結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	9:15		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	400mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	9:30		
	生理食塩液	全量250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	500mL/h	11:30		
No.4	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	13:35		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	46時間で	13:40		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューサーホップ(3.7mL/h)使用				
No.8	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈			化学療法終了時	
No.9	ポララミン注5mg1mL	5mg	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で		9:45	
	生理食塩液	50mL					
No.10	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	1時間で		10:00	
	生理食塩液	全量100mL					
No.11	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	500mL/h		11:00	
No.12	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈			化学療法終了時	

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	400mg/m ²	400mg/m ²
No.4	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.5	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	300mg/m ²
No.6	フルオロウラシル注	400mg/m ²	400mg/m ²
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	2400mg/m ²
No.10	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m ²	250mg/m ²

備考