

# レジメン名 : Pmab+FOLFOX (m6) 療法 (中心)

静岡県立静岡がんセンター

2021年2月9日 改訂

消化器内科

対象疾患: 結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	9:45		
	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL					
No.2	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	1時間で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈(側管)	500mL/h	11:00		
No.4	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:05		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:05		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	13:05		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	46時間で	13:10		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューサー・ポンプ(3.7mL/h)使用				
No.8	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	6mg/kg
No.4	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	85mg/m <sup>2</sup>
No.5	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	200mg/m <sup>2</sup>
No.6	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	400mg/m <sup>2</sup>
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	2400mg/m <sup>2</sup>

備考