

レジメン名 : CBDCA+PTX+Cmab療法 (初回)

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月17日 改訂

消化器内科

対象疾患: 頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	グラニセトン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	400mg/m ²	持続点滴末梢	2時間で	10:15		
	生理食塩液	全量250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:15		
No.4	パクリタキセル注	100mg/m ²	持続点滴末梢	1時間で	12:20		
	生理食塩液	250mL					
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC2.5	持続点滴末梢	1時間で	13:20		
	生理食塩液	250mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:20		

インターバル日数: 7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	400mg/m ²	400mg/m ²
No.4	パクリタキセル注	100mg/m ²	100mg/m ²
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC2.5	450mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アービタックス 毎週投薬 パクリタキセル、カルボプラチン 2週投薬 1週休薬