レジメン名：CBDCA+PTX+Cmab療法（初回）

静岡県立静岡がんセンター

2026年3月26日 改訂

消化器内科　　対象疾患：頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	アービタックス注射液	400mg/㎡	持続点滴末梢	2時間で	10:15		
	生理食塩液	全量250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:15		
No.4	パクリタキセル注	100mg/㎡	持続点滴末梢	1時間で	12:20		
	生理食塩液	250mL					
No.5	カルボプラチン注射液	AUC2.5	持続点滴末梢	1時間で	13:20		
	生理食塩液	250mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:20		

インターバル日数：　7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液	400mg/㎡	400mg/㎡
No.4	パクリタキセル注	100mg/㎡	100mg/㎡
No.5	カルボプラチン注射液	AUC2.5	450mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アービタックス　毎週投薬 パクリタキセル、カルボプラチン　2週投薬　1週休薬