

# レジメン名 : CBDCA+PTX+Cmab療法(2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月17日 改訂

消化器内科

対象疾患:頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	1時間で	10:15		
	生理食塩液	全量100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:15		
No.4	パクリタキセル注	100mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	1時間で	11:20		
	生理食塩液	250mL					
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC2.5	持続点滴末梢	1時間で	12:20		
	生理食塩液	250mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	13:20		

インターバル日数: 7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m <sup>2</sup>	250mg/m <sup>2</sup>
No.4	パクリタキセル注	100mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC2.5	450mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アービタックス 毎週投薬 パクリタキセル、カルボプラチン 2週投薬 1週休薬