レジメン名： GEM + nab-PTX療法

静岡県立静岡がんセンター

2026年1月26日 改訂

消化器内科　　対象疾患：膵がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（15）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:00	10:00	10:00
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	アブラキサン点滴静注用	125mg/㎡	持続点滴末梢	30分で	10:15	10:15	10:15
	生理食塩液（100mgあたり20mLで溶解）						
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:45	10:45	10:45
No.4	ゲムシタビン点滴静注液	1000mg/㎡	持続点滴末梢	30分で	10:50	10:50	10:50
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:20	11:20	11:20

インターバル日数：　28日

	商品名	標準値	上限値
No.2	アブラキサン点滴静注用	125mg/㎡	125mg/㎡
No.4	ゲムシタビン点滴静注液	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考