## レジメン名: mFOLFIRINOX療法(アトロピン無)

静岡県立静岡がんセンター

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月19日 改訂

消化器内科 対象疾患: 膵がん

/		7.3 2317771011 11 11					
通しNo		投与量	手技・投与ルート	点滴時間·速度	day(1)	day()	day()
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	30分で	10:00		
	デキサート注射液 3.3mg/mL	2mL				_	
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/ <b>m</b> ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	2時間で	10:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/ <b>m</b> ⁴	中心静脈(側管)	2時間で	12:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg∕ <b>m</b> i̇́	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	90分で	13:00		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/ <b>m</b> i	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	46時間で	14:30		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューサーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.6	へパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		10		

インターバル日数: 14日

	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	$85 \mathrm{mg/m^2}$	85mg∕ <b>m</b> i̇́
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/ <b>m</b> ²	200mg/ <b>m</b> ²
No.4	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/ <b>m</b> ²	150mg/ <b>m</b> i
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/ <b>m</b> i̇́	2400mg/ <b>m</b> i

備考	