レジメン名： mFOLFIRINOX療法（アトロピン有）

静岡県立静岡がんセンター

2025年10月2日 改訂

消化器内科　　対象疾患：膵がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈（埋込型カテーテル使用）	30分で	10:00		
	デキサート注射液 3.3mg/mL	2mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	中心静脈（埋込型カテーテル使用）	5分で	10:30		
No.3	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	中心静脈（埋込型カテーテル使用）	2時間で	10:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	中心静脈（側管）	2時間で	12:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	アトロピン硫酸塩注0.5mg1mL	1管	中心静脈（埋込型カテーテル使用）	15分で	12:50		
	生理食塩液	50mL					
No.6	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/㎡	中心静脈（埋込型カテーテル使用）	90分で	13:05		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	中心静脈（埋込型カテーテル使用）	46時間で	14:35		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューザーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.8	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		1回		

インターバル日数：　14日

	商品名	標準値	上限値
No.3	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	85mg/㎡
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	200mg/㎡
No.6	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/㎡	150mg/㎡
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	2400mg/㎡

備考