

レジメン名： FOLFIRINOX療法(アトロピン無)

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月19日 改訂

消化器内科

対象疾患：膵がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	15分で	10:00		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	120分で	10:15		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	120分で	12:15		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	イリノテカン塩酸塩点滴静注	180mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	90分で	12:45		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	5分で	14:15		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	46時間で	14:20		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューザーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.7	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		1回		

インターバル日数： 14日

	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	200mg/m ²
No.4	イリノテカン塩酸塩点滴静注	180mg/m ²	180mg/m ²
No.5	フルオロウラシル注	400mg/m ²	400mg/m ²
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	2400mg/m ²

備考
アプレピタント内服