レジメン名： nal-IRI+5FU/LV療法

静岡県立静岡がんセンター

2023年5月30日 改訂

消化器内科　　対象疾患：膵がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	30分で	10:00		
	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	5分で	10:30		
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	中心静脈(側管)	2時間で	10:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	オニバイド点滴静注	70mg/㎡	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	90分	11:05		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.5	生理食塩液	50mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	5分で	12:35		
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	46時間で	12:40		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューザーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.7	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		1回		

インターバル日数：　14日

	商品名	標準値	上限値
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	200mg/㎡
No.4	オニバイド点滴静注	70mg/㎡	70mg/㎡
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	2400mg/㎡

備考