レジメン名：ベバシズマブ(10)＋パクリタキセル(90)併用療法

静岡県立静岡がんセンター
2024年11月14日 改訂

乳腺腫瘍内科　　対象疾患：乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（15）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢 メイン	15分で	13:00	13:00	13:00
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢 メイン	15分で	13:15	13:15	13:15
No.3	パクリタキセル注	90mg/㎡	持続点滴末梢 メイン	60分で	13:30	13:30	13:30
	生理食塩液	250mL					
No.4	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢 メイン	5分で	14:30		14:30
No.5	ベバシズマブBS点滴静注用	10mg/kg	持続点滴末梢 メイン	90分で	14:35		14:35
	生理食塩液	100mL		2回目60分で			
				3回目以降30分で			
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢 メイン	5分で	16:05	14:30	16:05

インターバル日数　28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	90mg/㎡	90mg/㎡
No.5	ベバシズマブBS点滴静注用	10mg/kg	10mg/kg

備考