

# レジメン名 : PER+HER+Doc併用療法(2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター

2024年7月25日 改訂

乳腺腫瘍内科

対象疾患: 乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	14:00		
	生理食塩液	50mL					
No.2	パージェタ 420mg/14mL	420mg	持続点滴末梢	30分で	14:15		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:45		
No.4	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	持続点滴末梢	30分で	14:50		
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:20		
No.6	ドセタキセル点滴静注液	75mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	60分で	15:25		
	生理食塩液	250mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	16:25		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	パージェタ点滴静注	420mg	420mg
No.4	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	6mg/kg
No.6	ドセタキセル点滴静注液	75mg/m <sup>2</sup>	75mg/m <sup>2</sup>

備考
ドセタキセルはアルコールフリー製剤を使用