

レジメン名 : CBDCA+PEM療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年8月5日 改訂

呼吸器内科

対象疾患 : 非小細胞肺がん、悪性胸膜中皮腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	2mL 50mL	点滴末梢	15分で	10:15		
No.2	アリムタ注射用 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	500mg/m ² 30mL	点滴末梢	10分で	10:30		
No.3	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液	AUC5 250mL	点滴末梢	1時間で	10:40		
No.4	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:40		

インターバル日数 : 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンピタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 アプレピタント内服