レジメン名：CBDCA+VP-16療法（高齢者）

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

呼吸器内科　　対象疾患：小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:15		
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:15		
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.3	エトポシド点滴静注液	80mg/㎡	持続点滴末梢	90分で	10:30		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	90分で	12:00		
	生理食塩液	500mL					
No.5	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	90分で	13:30		
No.6	生理食塩液	50mL	プライミング			10:30	10:30
No.7	エトポシド点滴静注液	80mg/㎡	持続点滴末梢	90分で		10:30	10:30
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		12:00	12:00

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	エトポシド点滴静注液	80mg/㎡	80mg/㎡
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.7	エトポシド点滴静注液	80mg/㎡	80mg/㎡

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アプレピタント内服