レジメン名：アムルビシン単剤療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年2月12日 改訂

呼吸器内科

対象疾患：小細胞肺がん、非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:15	10:15	10:15
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	ソルデム3A輸液	200mL	持続点滴末梢	30分で	10:30	10:30	10:30
No.3	生理食塩液	50mL	プライミング		10:30	10:30	10:30
No.4	カルセド注射用 20mg	45mg/㎡	点滴末梢(側管)	5分で	10:30	10:30	10:30
	生理食塩液（一次溶解液）						
	生理食塩液	50mL					
	側管、全開						
No.5	生理食塩液	50mL	点滴末梢(側管)	5分で	10:35	10:35	10:35
	側管、全開						

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	カルセド注射用 20mg	45mg/㎡	45mg/㎡

備考
非小細胞肺がん　35mg/㎡で開始 小細胞肺がん　40mg/㎡で開始