

レジメン名 : CBDCA+ALIMTA+Pembrolizumab療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:30		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分で	10:30		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	10分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	11:10		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.5	アリムタ注射用	500mg/m ²	点滴末梢	360mL/h	11:25		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	点滴末梢	60分で	11:35		
	生理食塩液	250mL					
No.7	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	12:35		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.5	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 アプレピタント内服