レジメン名：GCD療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

血液・幹細胞移植科　　対象疾患：悪性リンパ腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（7）	day（8）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	10mL	点滴末梢	15分で	10:00							
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL										
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL	10mL	点滴末梢	15分で		10:00	10:00	10:00				
	生理食塩液	50mL										
No.3	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL	点滴末梢	15分で								10:00
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	点滴末梢	60分で	10:15							
	生理食塩液	250mL										
No.5	ジェムザール注	1000mg/㎡	点滴末梢	30分で	11:15							10:15
	生理食塩液（一次溶解液）											
	ソルデム3A輸液	200mL										
No.6	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:45							10:45

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	800mg
No.5	ジェムザール注	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 day2-4のデキサメタゾン　内服になる場合あり