## レジメン名: THP-COP療法

血液 幹細胞移植科

対象疾患:悪性リンパ腫

	新日夕·坦牧	投与量	手技・投与ルート	点滴時間∙速度	da(1)	d=( )	ا / المام
通しNo					day(1)	day( )	day( )
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	点滴末梢	15分で	11:00		
No.2	ピノルビン注	50mg/ <b>m</b> i̇́	点滴末梢	30分で	11:15		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.3	オンコビン注1mg	1.4mg/ <b>m</b> ²	点滴末梢	15分で	11:45		
110.0	生理食塩液(一次溶解液)	111118/111		10,, 0			
	生理食塩液	50mL					
-	工程及温放	JOINE					
No.4	上 注射用エンドキサン	750mg/ <b>m</b> ²		120分で	12:00		
110.4	生理食塩液(一次溶解液)	/ Joing/ 111	WADACAL	120/1 C	12.00		
	土垤艮塩液(一次冷胜液)	0501					
	生理食塩液	250mL					
	11 TM A 16 15			F/1-			
No.5	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	14:00		
						<del> </del>	
			+				

インターバル日数: 21日

通しNo		標準値	上限值
	ピノルビン注	50mg/ <b>m</b> ⁴	50mg/ <b>m</b> ⁴
No.3	オンコビン注1mg	1.4mg/ <b>m</b> ²	2mg/body
No.4	注射用エンドキサン	750mg/ <b>m</b> i	750mg/ <b>m</b> i̇́

備考
day1-5 プレドニン 100mg/body
リツキシマブ併用する場合あり