

レジメン名 : Daratumumab+Bor+Dex療法(2回目)

静岡県立静岡がんセンター

2022年6月15日 改訂

血液・幹細胞移植科

対象疾患 : 多発性骨髄腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	5mL	点滴末梢	15分で	10:00		
	ポララミン注 5mg	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	点滴末梢	50mL/h~	10:15		
	生理食塩液	全量500mL		最大200mL/h			
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時		
No.4	ベルケイド注射用 3mg	1.3mg/m ²	皮下注射	ワンショット	ダラザレックス		
	生理食塩液(3mgあたり1.2mLで溶解)				終了時		

インターバル日数: 7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	16mg/kg
No.4	ベルケイド注射用 3mg	1.3mg/m ²	1.3mg/m ²

備考
※DRd療法するとき レブラミド内服あり、ベルケイドなし