レジメン名：Daratumumab+Bor+Dex療法（3回目以降）

静岡県立静岡がんセンター

2022年6月15日 改訂

血液・幹細胞移植科　　対象疾患：再発又は難治性の多発性骨髄腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（）	day（）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	5mL	点滴末梢	15分で	10:00		
	ポララミン注 5mg	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	点滴末梢	100mL/h～	10:15		
	生理食塩液	全量500mL		最大200mL/h			
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時		
No.4	ベルケイド注射用 3mg	1.3mg/㎡	皮下注射	ワンショット	ダラザレックス		
	生理食塩液（3mgあたり1.2mLで溶解）				終了時		

インターバル日数：　7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ダラザレックス点滴静注	16mg/kg	16mg/kg
No.4	ベルケイド注射用 3mg	1.3mg/㎡	1.3mg/㎡

備考
DBd療法 1～8週　ダラザレックス、ベルケイド1週間毎 9～24週　ダラザレックス3週間毎、ベルケイド1週間毎 25週以降　ダラザレックス4週間毎、ベルケイドなし DKd療法　カイプロリスday1,2,8,9,15,16投与　4週間毎を繰り返し、ベルケイドなし 1～8週　ダラザレックス1週間毎 9～24週　ダラザレックス2週間毎 25週以降　ダラザレックス4週間 DRd療法　レブラミド3週間内服1週間休薬、ベルケイドなし 1～8週　ダラザレックス1週間毎 9～24週　ダラザレックス2週間毎 25週以降　ダラザレックス4週間毎 D-VMP療法 1、7、13、19、25、31、37、43, 49週目にアルケラン、プレドニゾロンを4日間内服 1～6週　ダラザレックス1週間毎、ベルケイド1週間毎 7～54週　ダラザレックス3週間毎、ベルケイドday1,8投与 day15休みを繰り返し 55週以降　ダラザレックス4週間毎、ベルケイドなし