

レジメン名:A(アドセトリス)-AVD療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

血液・幹細胞移植科

CD30陽性のホジキンリンパ腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	アロキシ点滴静注0.75mg 50mL	50mL	点滴末梢	15分で	9:00		
No.2	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	25mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分で	9:15		
No.3	エクザール注 10mg 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	6mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分で	9:30		
No.4	5%ブドウ糖液	250mL	点滴末梢	60分で	9:45		
No.5	ダカルバジン注 100mg 注射用水(一次溶解液) 生理食塩液	375mg/m ² 100mL	点滴末梢(側管)	60分で	9:45		
No.6	ポラミン5mg 1mL 水溶性ヒドロコトロン100mg 生理食塩液	5mg 100mg 50mL	点滴末梢	15分で	10:45		
No.7	アドセトリス点滴静注用50mg/V 注射用水(一次溶解液) 生理食塩液	1.2mg/kg 100mL	点滴末梢	30分で	11:00		
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:30		

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	25mg/m ²	25mg/m ²
No.3	エクザール注 10mg	6mg/m ²	10mg
No.5	ダカルバジン注 100mg	375mg/m ²	375mg/m ²
No.7	アドセトリス点滴静注用50mg/V	1.2mg/kg	120mg

備考
ダカルバジン注250~275mg/m ² に減量の場合あり