

レジメン名 : C225+イリノテカン併用療法(2回目以降/中心静脈)

静岡県立静岡がんセンター
2021年3月31日 改訂

消化器内科

対象疾患:結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	200mL/h	10:15		
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	1時間で	10:30		
	生理食塩液	全量100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	500mL/h	11:30		
No.4	カンプト点滴静注	150mg/m ²	中心静脈(埋込型カテーテル使用)	165mL/h	11:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		13:05		

インターバル日数: 7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m ²	250mg/m ²
No.4	カンプト点滴静注	150mg/m ²	150mg/m ²

備考
アービタックス 毎週投薬 カンプト 2週毎投薬