

レジメン名 : FOLFOX(中心静脈)－RT療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月31日 改訂

消化器内科

対象疾患 : 食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈(高カロリー輸液なし)	15分で	9:15		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈(高カロリー輸液なし)	120分で	9:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈(側管)	120分で	9:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈(高カロリー輸液なし)	5分で	11:30		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.5	フルオロウラシル注	1600mg/m ²	中心静脈(高カロリー輸液なし) 東レ トレフューサーポンプ(3.7mL/h)使用	46時間で	11:35		
	生理食塩液	全量140mL					
No.6	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	200mg/m ²
No.4	フルオロウラシル注	400mg/m ²	400mg/m ²
No.5	フルオロウラシル注	1600mg/m ²	1600mg/m ²

備考
6サイクル投与