

レジメン名 : Gem+Cis療法(末梢静脈)

静岡県立静岡がんセンター

2021年6月14日 改訂

泌尿器科

対象疾患:尿路上皮がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)
No.1	カイトリル点滴静注バッグ3.0mg100mL	100mL	持続点滴末梢	30分で	13:00		10:00	10:00
No.2	ジェムザール注 生理食塩液(一次溶解液)	1000mg/m ²	持続点滴末梢	30分で	13:30		10:30	10:30
	ソルデム3A輸液	200mL						
No.3	ソルデム3A輸液 生理食塩液	1000mL 1000mL	持続点滴末梢	20時間で	14:00			
No.4	ソルデム3A輸液 生理食塩液	500mL 500mL	持続点滴末梢	3時間で		10:00		
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL カイトリル点滴静注バッグ3.0mg100mL	3mL 100mL	持続点滴末梢	30分で		13:00		
No.6	マンニトールS注射液15%	100mL	持続点滴末梢	30分で		13:30		
No.7	シスプラチン注	70mg/m ²	持続点滴末梢	1時間で		14:00		
No.8	マンニトールS注射液15%	200mL	持続点滴末梢	1時間で		15:00		
No.9	ソルデム3A輸液 ハルトマンド液	500mL 500mL	持続点滴末梢	3時間で		16:00		
No.10	ソルデム3A輸液 ハルトマンド液	1000mL 1500mL	持続点滴末梢	15時間で		19:00		
No.11	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で			11:00	11:00

インターバル日数: 28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ジェムザール注	1000mg/m ²	1000mg/m ²
No.7	シスプラチン注	70mg/m ²	70mg/m ²

備考