

レジメン名：(泌尿)BEP療法

泌尿器科

対象疾患：胚細胞腫瘍

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(0)	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(8)	day(15)
No.1	ラクテック注	1000mL	中心静脈	20時間で	14:00							
	ソルデム3A輸液	1000mL										
No.2	ハルトマンD液	1500mL	中心静脈	24時間で		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
	ソルデム3A輸液	1500mL										
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈(側管)	15分で		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
	カイトリル点滴静注バッグ3.0mg100mL	100mL										
No.4	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	中心静脈(側管)	2時間で		10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
	生理食塩液	500mL										
No.5	マンニトールS注射液15%	50mL	中心静脈(側管)	30分で		13:30	13:30	13:30	13:30	13:30		
No.6	シスプラチン注	20mg/m ²	中心静脈(側管)	1時間で		14:00	14:00	14:00	14:00	14:00		
No.7	マンニトールS注射液15%	100mL	中心静脈(側管)	1時間で		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
No.8	生理食塩液	1000mL	中心静脈(側管)	8時間で		16:00	16:00	16:00	16:00	16:00		
No.9	ブレオ注射用	30mg	中心静脈(側管)	30分で		16:30					10:00	10:00
	生理食塩液(一次溶解液)											
	生理食塩液	50mL										
No.10	生理食塩液	50mL	中心静脈(側管)	5分で							11:00	11:00
No.11	生理食塩液	50mL	バックプライミング			1回	1回	1回	1回	1回		

インターバル日数： 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	100mg/m ²
No.6	シスプラチン注	20mg/m ²	20mg/m ²
No.9	ブレオ注射用	30mg	30mg

備考