レジメン名：IRI（150）＋Pmab療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年6月21日 改訂

消化器内科　　対象疾患：結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈・高カロリー輸液なし	15分で	9:45		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	中心静脈・高カロリー輸液なし	1時間で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈・高カロリー輸液なし	500mL/h	11:00		
No.4	カンプト点滴静注用	150mg/㎡	中心静脈・高カロリー輸液なし	90分で	11:05		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数：　14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	6mg/kg
No.4	カンプト点滴静注用	150mg/㎡	150mg/㎡

備考
アプレピタント内服