レジメン名：IRI（150）+2wCmab療法

静岡県立静岡がんセンター
2024年12月19日 改訂

消化器内科　　対象疾患：結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈	15分で	10:00		
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	500mg/㎡	中心静脈	120分で	10:15		
	生理食塩液	全量250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で	12:15		
No.4	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/㎡	中心静脈	90分で	12:20		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で	13:50		
No.6	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		13:55		

インターバル日数：　14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	500mg/㎡	500mg/㎡
No.4	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/㎡	150mg/㎡

備考