

# レジメン名 : FOLFIRI(180)+wCmab療法(初回)

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月19日 改訂

消化器内科

対象疾患:結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day( )
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	9:15		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	9:30		
	生理食塩液	全量250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	500mL/h	11:30		
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:35		
	生理食塩液	500mL					
No.5	イリノテカン塩酸塩点滴静注	180mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	90分で	11:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	13:35		
	生理食塩液	50mL					
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	46時間で	13:40		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューザーホップ(3.7mL/h)使用				
No.8	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈			化学療法終了時	
No.9	ポララミン注5mg1mL	5mg	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で		9:15	
	生理食塩液	50mL					
No.10	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	1時間で		9:30	
	生理食塩液	全量100mL					
No.11	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	500mL/h		10:30	
No.12	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈			化学療法終了時	

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アービタックス注射液100mg/20mL	400mg/m <sup>2</sup>	400mg/m <sup>2</sup>
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	200mg/m <sup>2</sup>
No.5	イリノテカン塩酸塩点滴静注	180mg/m <sup>2</sup>	180mg/m <sup>2</sup>
No.6	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	400mg/m <sup>2</sup>
No.7	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	2400mg/m <sup>2</sup>
No.10	アービタックス注射液100mg/20mL	250mg/m <sup>2</sup>	250mg/m <sup>2</sup>

備考