

# レジメン名 : FOLFOX+BEV療法

消化器内科

対象疾患: 結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	ベバシズマブBS点滴静注 生理食塩液	5mg/kg 100mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	30分で	10:30		
No.2	アロキシ点点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg/mL	50mL 2mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	11:00		
No.3	エルプラット点滴静注液 5%ブドウ糖液	85mg/m <sup>2</sup> 250mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:15		
No.4	レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	11:15		
No.5	フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m <sup>2</sup> 50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	13:15		
No.6	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400mg/m <sup>2</sup> 全量140mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし 東レ トレフューサーポンプ(3.7mL/h)使用	46時間で	13:20		
No.7	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈			化学療法終了時	

インターバル日数: 14日

P

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	ベバシズマブBS点滴静注	5mg/kg	5mg/kg
No.3	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	85mg/m <sup>2</sup>
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	300mg/m <sup>2</sup>
No.5	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	400mg/m <sup>2</sup>
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	2400mg/m <sup>2</sup>

備考