レジメン名：XELOX＋BEV療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月16日 改訂

消化器内科　　対象疾患：結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	ベバシズマブBS点滴静注	7.5mg/kg	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.2	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	15分で	10:30		
	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL					
No.3	エルプラット点滴静注液	130mg/㎡	持続点滴末梢	2時間で	10:45		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.4	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	化学療法終了時		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	ベバシズマブBS点滴静注	7.5mg/kg	7.5mg/kg
No.3	エルプラット点滴静注液	130mg/㎡	130mg/㎡

備考
ゼローダ　2000mg/㎡/日、分2（朝、夕食後） 2週間内服　1週間休薬 アプレピタント内服