静岡県立静岡がんセンター 2024年12月19日 改訂

消化器内科

対象疾患:結腸・直腸がん

| 通しNo 商品名・規格 投与量 手技・投与ルート 点滴時間・速度 day(1) day(2) No.1 ペパシズマブBS点滴静注 7.5mg/kg 持続点滴末梢 30分で 10.00 No.2 デキサート注射液3.3mg/mL 2mL 持続点滴末梢 30分で 10:30 No.3 イリノテカン塩酸塩点滴静注 200mg/m² 持統点滴末梢 90分で 11:00 No.4 59%ブドウ糖液 250mL 持統点滴末梢 5分で 化学療法終了時 No.4 5%ブドウ糖液 50mL 持統点滴末梢 5分で 化学療法終了時 | | | 7.1367人心・中1787 | | | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|-------|
| 生理食塩液 100mL 100mL No.2 デキサート注射液3.3mg/mL 2mL 持続点滴末梢 30分で 10:30 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL 50mL 10:30 No.3 イリノテカン塩酸塩点滴静注 200mg/m² 持続点滴末梢 90分で 11:00 5%ブドウ糖液 250mL 10:30 11:00 | 通しNo | 商品名∙規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間·速度 | day(1) | day() | day() |
| 生理食塩液 100mL 100mL No.2 デキサート注射液3.3mg/mL 2mL 持続点滴末梢 30分で 10:30 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL 50mL 10:30 No.3 イリノテカン塩酸塩点滴静注 200mg/m² 持続点滴末梢 90分で 11:00 5%ブドウ糖液 250mL 10:30 11:00 | No.1 | ベバシズマブBS点滴静注 | 7.5mg/kg | 持続点滴末梢 | 30分で | 10:00 | | |
| アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL 50mL 90分で 11:00 No.3 イリノテカン塩酸塩点滴静注 200mg/m² 持続点滴末梢 90分で 11:00 5%ブドウ糖液 250mL 90分で 11:00 | | 生理食塩液 | | | | | | |
| アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL 50mL 90分で 11:00 No.3 イリノテカン塩酸塩点滴静注 200mg/m² 持続点滴末梢 90分で 11:00 5%ブドウ糖液 250mL 90分で 11:00 | | | | | | | | |
| アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL 50mL 90分で 11:00 No.3 イリノテカン塩酸塩点滴静注 200mg/m² 持続点滴末梢 90分で 11:00 5%ブドウ糖液 250mL 90分で 11:00 | No.2 | デキサート注射液3.3mg/mL | 2mL | 持続点滴末梢 | 30分で | 10:30 | | |
| 5%ブドウ糖液 250mL 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 2 5 2 6 1 7 2 7 2 8 2 9 3 9 3 9 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 | | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 50mL | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 250mL 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 2 5 2 6 1 7 2 7 2 8 2 9 3 9 3 9 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 | | | | | | | | |
| | No.3 | イリノテカン塩酸塩点滴静注 | 200mg/ m ² | 持続点滴末梢 | 90分で | 11:00 | | |
| No.4 5%プドウ糖液 50mL 持続点滴末梢 5分で 化学療法終了時 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 5%ブドウ糖液 | 250mL | | | | | |
| No.4 5%ブドウ糖液 50mL 持続点滴末梢 5分で 化学療法終了時 | | | | | | | | |
| | No.4 | 5%ブドウ糖液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 5分で | 化学療法終了時 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

インターバル日数: 21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限值 |
|------|---------------|-------------------|-------------------|
| No.1 | ベバシズマブBS点滴静注 | 7.5mg/kg | 7.5mg/kg |
| No.3 | イリノテカン塩酸塩点滴静注 | 200mg/ m ² | 200mg/ m ² |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備考 ゼロ―ダ 1600mg/㎡/日、分2(朝、夕食後) 2週間内服 1週間休薬 アプレピタント内服