レジメン名：FOLFOX療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年6月10日 改訂

消化器内科　　対象疾患：結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈・埋込・高ｶﾛﾘｰ輸液なし	15分で	11:15		
	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	中心静脈・埋込・高ｶﾛﾘｰ輸液なし	2時間で	11:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	中心静脈・埋込・高ｶﾛﾘｰ輸液なし	2時間で	11:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	フルオロウラシル注	400mg/㎡	中心静脈・埋込・高ｶﾛﾘｰ輸液なし	5分で	13:30		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	中心静脈・埋込・高ｶﾛﾘｰ輸液なし	46時間で	13:35		
	生理食塩液	全量140mL	東レ ﾄﾚﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ(3.7mL/h)使用				
No.6	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数：　14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	85mg/㎡
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	300mg/㎡
No.4	フルオロウラシル注	400mg/㎡	400mg/㎡
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	2400mg/㎡

備考