

レジメン名 : FOLFOXIRI(165)+RAM療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年6月10日 改訂

消化器内科

対象疾患: 結腸・直腸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	10:00		
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	サイラムザ点滴静注	8mg/kg	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	1時間で	10:15		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	11:15		
No.4	カンプト点滴静注用	165mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	90分で	11:20		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	12:50		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	12:50		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.7	フルオロウラシル注	3200mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	48時間で	14:50		
	生理食塩液	全量全量140mL					
No.8	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	サイラムザ点滴静注	8mg/kg	8mg/kg
No.4	カンプト点滴静注用	165mg/m ²	165mg/m ²
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	200mg/m ²
No.7	フルオロウラシル注	3200mg/m ²	3200mg/m ²

備考
アプレピタント内服