レジメン名：（外来only）Rituximab療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年6月21日 改訂

血液・幹細胞移植科　　対象疾患：悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	ソル・コーテフ注射用	100mg	ワンショット末梢		10:00		
	ポララミン注	5mg					
	生理食塩液	20mL					
No.3	リツキサン点滴静注	375mg/㎡	点滴末梢	25mL/h～	10:00		
	生理食塩液	250mL		最大240mL/h			
No.4	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時		

インターバル日数：　7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	リツキサン点滴静注	375mg/㎡	375mg/㎡

備考
R-Venetoclax療法 ベネクレクスタと併用　1サイクル4週間として リツキサン　1サイクル目375mg/㎡　day1投与 （2～6サイクルは別レジメン） R^2療法　1サイクル4週間として レブラミド3週間内服1週間休薬　1～12サイクル リツキサン 1サイクル目　day1,8,15,22投与 2～5サイクル目　day1投与 維持療法　2ヶ月毎　2年間 上記以外の単剤療法　1週間毎