

レジメン名 : Pola-BR療法 (初回)

静岡県立静岡がんセンター

2022年6月23日 改訂

血液・幹細胞移植科

対象疾患: 悪性リンパ腫

備考	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day()
No.1	アロキシ点滴静注バック0.75mg/50mL	50mL	点滴末梢	10分で	9:50		
	ソル・コーテフ注射用	100mg					
	ポララミン注	5mg					
No.2	トレアキシン点滴静注用	90mg/m ²	点滴末梢	10分で	10:00	10:00	
	生理食塩液	50mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	10:10	10:10	
No.4	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	120mL/h~	10:15		
	生理食塩液	250mL		最大240mL/h			
No.5	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時		
No.6	ソル・コーテフ注射用	100mg	ワンショット末梢			10:15	
	ポララミン注	5mg					
	生理食塩液	20mL					
No.7	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	点滴末梢	90分で		10:15	
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.8	生理食塩液	25mL	点滴末梢	36mL/h		化学療法終了時	

インターバル日数: 21日

備考	商品名	標準値	上限値
No.2	トレアキシン点滴静注用	90mg/m ²	90mg/m ²
No.4	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	375mg/m ²
No.7	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	1.8mg/kg

備考