

レジメン名 : Pola-BR療法 (2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター

2022年6月15日 改訂

血液・幹細胞移植科

対象疾患: 悪性リンパ腫

備考	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day()
No.1	アロキシ点滴静注バック0.75mg/50mL	50mL	点滴末梢	10分で	9:20		
	ソル・コーテフ注射用	100mg					
	ポララミン注	5mg					
No.2	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で		9:25	
No.3	トレアキシ点滴静注用	90mg/m ²	点滴末梢	10分で	9:30	9:30	
	生理食塩液	50mL					
No.4	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	9:40	9:40	
No.5	ソル・コーテフ注射用	100mg	ワンショット末梢			9:45	
	ポララミン注	5mg					
	生理食塩液	20mL					
No.6	ポライビー点滴静注用 注射用水(一次溶解液)	1.8mg/kg	点滴末梢	30分で	9:45		
	生理食塩液	50mL					
No.7	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	120mL/h~		9:45	
	生理食塩液	250mL		最大240mL/h			
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時	化学療法終了時	

インターバル日数: 21日

備考	商品名	標準値	上限値
No.3	トレアキシ点滴静注用	90mg/m ²	90mg/m ²
No.6	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	1.8mg/kg
No.7	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	375mg/m ²

備考