レジメン名：Pembrolizumab＋GEM＋CBDCA療法

静岡県立静岡がんセンター
2021年10月13日 改訂

乳腺外科　　対象疾患：乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:30		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	9:30		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:05	10:00	
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.5	ジェムザール注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	30分で	10:20	10:15	
	生理食塩液（一次溶解液）						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC2	持続点滴末梢	60分で	10:50	10:45	
	生理食塩液	250mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:50	11:45	

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.5	ジェムザール注	1000mg/㎡	1000mg/㎡
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC2	350mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出