

レジメン名 : CBDCA + Paclitaxel療法

静岡県立静岡がんセンター

2023年6月14日 改訂

呼吸器内科

対象疾患 : 非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	15分で	10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	生理食塩液	100mL	持続点滴末梢	15分で	10:15		
No.3	パクリタキセル注	200mg/m ²	持続点滴末梢	3時間で	10:30		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	90分で	13:30		
	生理食塩液	500mL		2回目60分で			
				3回目以降30分で			
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:00		

インターバル日数 : 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	200mg/m ²	200mg/m ²
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アプレピタント内服