

レジメン名 : (CM9LA) CDDP+PEM+Ipi+Nivo療法 (2サイクル目)

静岡県立静岡がんセンター
2021年12月16日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	30分で	10:30		
No.4	生理食塩液	500mL	点滴末梢	60分で	10:35		
	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL					
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢	15分で	11:35		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.6	アリムタ注射用	500mg/m ²	点滴末梢	360mL/h	11:50		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.7	ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	60分で	12:00		
No.8	シスプラチン注	75mg/m ²	点滴末梢	60分で	13:00		
	生理食塩液	全量500mL					
No.9	ラシックス注20mg/2mL	20mg	ワンショット末梢		14:00		
No.10	ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	60分で	14:00		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	オプジーボ点滴静注	360mg	360mg
No.6	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²
No.8	シスプラチン注	75mg/m ²	75mg/m ²

備考
初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 アプレピタント内服