レジメン名：（CM9LA）CBDCA+PEM+Ipi+Nivo療法（2サイクル目）

静岡県立静岡がんセンター
2021年10月5日 改訂

呼吸器内科　　対象疾患：非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	10:30		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.6	アリムタ注射用	500mg/㎡	点滴末梢	360mL/h	10:45		
	生理食塩液（一次溶解液）						
	生理食塩液	30mL					
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	点滴末梢	60分で	10:55		
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:55		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	オプジーボ点滴静注	360mg	360mg
No.6	アリムタ注射用	500mg/㎡	500mg/㎡
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 　葉酸（パンビタン末 1g）　1日1回　連日内服 　ビタミンB12　1mg　筋注　9週間毎 アプレピタント内服